Факультативно. Электрическое поле заряда, движущегося с постоянной скоростью.

$\vec{E} \approx q\dfrac{\vec{r}}{r^3}$ с точностью до величин порядка $\dfrac{V^2}{c^2}$.



Линии поля $\vec{E}$ несколько сгущаются к плоскости перпендикулярной скорости заряда $\vec{V}$.

Экзамен. Электростатическое поле E произвольного распределения неподвижных зарядов.

Пусть кроме пробного заряда q' есть система точечных зарядов $\{q_i\}$.

Согласно принципу суперпозиции $\vec{F}' = \sum_i \vec{F}_i'$. Разделим это равенство на q' и получим

$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$ — это равенство тоже называют принципом суперпозиции.

Подставим сюда $\vec{E}_i = \dfrac{q_i}{\left|\vec{r} - \vec{r}_i\right|^3} \cdot \left(\vec{r} - \vec{r}_i\right)$ и получим

$\vec{E}\left(\vec{r}\right) = \sum_i \dfrac{q_i}{\left|\vec{r} - \vec{r}_i\right|^3} \cdot \left(\vec{r} - \vec{r}_i\right)$, где $\vec{r}_i$ — радиус-вектор заряда q_i.

Иногда удобно рассматривать непрерывное распределение заряда, а не точечные заряды, например, в плазме газового разряда или для электронного облака в атоме водорода.

Для описания непрерывных распределений зарядов введем понятие плотности зарядов:

$\rho \equiv \dfrac{dq}{dV}$ — объемная плотность заряда по аналогии с объемной плотностью массы $\rho \equiv \dfrac{dm}{dV}$,

$\sigma \equiv \dfrac{dq}{dS}$ — поверхностная плотность заряда,

$\tau \equiv \dfrac{dq}{dl}$ — линейная плотность заряда.

Из этих определений следует:

$dq = \rho\, dV = \sigma\, dS = \tau\, dl$. Это равенство можно умножить на любую функцию координат и просуммировать по всем зарядам. Тогда

$\sum_i (\cdot) q_i \leftrightarrow \int_{V'} (\cdot)\rho(\vec{r}\,')\, dV' \leftrightarrow \int_{S'} (\cdot)\sigma(\vec{r}\,')\, dS' \leftrightarrow \int_{l'} (\cdot)\tau(\vec{r}\,')\, dl'$, где вместо точки может быть любая функция координат.

Если эта функция $\dfrac{\vec{r}-\vec{r}_i}{|\vec{r}-\vec{r}_i|^3}$, то

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_i \frac{\vec{r}-\vec{r}_i}{|\vec{r}-\vec{r}_i|^3} q_i + \int_{V'} \frac{\vec{r}-\vec{r}\,'}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^3} \rho(\vec{r}\,')\, dV' + \int_{S'} \frac{\vec{r}-\vec{r}\,'}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^3} \sigma(\vec{r}\,')\, dS' + \int_{l'} \frac{\vec{r}-\vec{r}\,'}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^3} \tau(\vec{r}\,')\, dl'$$

— поле произвольного распределения зарядов.

Если рассматривать все заряды, как объемные, то

$$\vec{E}(\vec{r}) = \int_{V'} \frac{\vec{r}-\vec{r}\,'}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^3} \rho(\vec{r}\,')\, dV',$$

если же рассматривать все заряды, как точечные, то

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_i \frac{\vec{r}-\vec{r}_i}{|\vec{r}-\vec{r}_i|^3} q_i .$$

В дальнейшем будем рассматривать заряды, то, как объемные, то, как точечные, в зависимости от того, как нам будет удобнее.

Экзамен. Линии электрического поля E.

Линия векторного поля — это линия, касательная в каждой точке к которой совпадает с направлением векторного поля в этой точке.

В физике к линиям поля есть дополнительное требование.

Плотность линий поля пропорциональна полю в каждой точке пространства.

(Число линий поля $\vec{E}$) / ($dS_{\perp\vec{E}}$) ≡ (Плотность линий поля $\vec{E}$) ~ E,

здесь $dS_{\perp\vec{E}}$ — проекция площадки, которую пронизывают линии поля $\vec{E}$, на плоскость перпендикулярную полю $\vec{E}$.

Условие пропорциональности числа линий поля самой напряженности поля не может быть выполнено в точности, так как напряженность может изменяться непрерывно, а число линий может изменяться только дискретно. Поэтому в физике понятие линий поля — нестрогое понятие.

Экзамен. Поток вектора электрического поля E.

Поток через поверхность — строгий аналог числа линий поля пронизывающих поверхность.

Введем поток Φ_E так, чтобы он был пропорционален числу линий поля, пронизывающих поверхность.

$d\Phi_E$ ~ (Число линий поля $\vec{E}$) = (Плотность линий поля $\vec{E}$) × $dS_{\perp\vec{E}}$ ~ $E\,dS_{\perp\vec{E}}$.

$d\Phi_E \equiv E\,dS_{\perp\vec{E}}$ — определение потока вектора $\vec{E}$ через поверхность, площадь проекции которой на плоскость перпендикулярную вектору $\vec{E}$ равна $dS_{\perp\vec{E}}$.

Выразим площадь проекции поверхности через площадь самой поверхности.



Здесь $\vec{n}$ — единичный вектор, направленный по нормали к поверхности dS.

Из рисунка видно, что $dS_{\perp\vec{E}} = dS\,\cos(\alpha)$.

Тогда $d\Phi_E \equiv E\,dS_{\perp\vec{E}} = E\,dS\,\cos(\alpha) = E\,dS\,\cos\left(\widehat{\vec{E},\vec{n}}\right)$.

Введем определение вектора площадки: $d\vec{S} \equiv \vec{n}\,dS$. Тогда $\cos\left(\widehat{\vec{E},\vec{n}}\right) = \cos\left(\widehat{\vec{E},d\vec{S}}\right)$.

Тогда $d\Phi_E = E\,dS\,\cos\left(\widehat{\vec{E},\vec{n}}\right) = E\,dS\,\cos\left(\widehat{\vec{E},d\vec{S}}\right) = \left(\vec{E},d\vec{S}\right)$.

$d\Phi_E \equiv \left(\vec{E},d\vec{S}\right)$ — определение потока поля $\vec{E}$ через произвольно ориентированную площадку $d\vec{S}$.

<u>Экзамен. Электростатическая теорема Гаусса.</u>

Теорема доказывается для неподвижных зарядов. По предположению Максвелла формулировка теоремы остается справедливой и для движущихся зарядов. Все следствия из этого предположения согласуются с опытом, следовательно, так оно и есть.

Теорема Гаусса утверждает, что

$\Phi_E = 4\pi Q$, где Φ_E — поток через замкнутую поверхность, границу объема V; Q — сумма зарядов в объеме V.

При вычислении потока используется внешняя нормаль к поверхности — нормаль, направленная наружу из объема V.

$\Phi_E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0}$ — теорема Гаусса в системе СИ.

Докажем теорему сначала для поля одного точечного заряда, а затем для поля любой суперпозиции зарядов.

Совместим начало координат с точечным зарядом q, тогда электрическое поле в любой точке $E = \dfrac{q}{r^2}$.

Рассмотрим малую площадку dS и поток через нее:

$$d\Phi_E = \left(\vec{E}, d\vec{S}\right) = E\,dS_{\perp\vec{E}} = E\,dS_{\perp\vec{r}} = \frac{q}{r^2}\,dS_{\perp\vec{r}} = q\,\frac{dS_{\perp\vec{r}}}{r^2} = q\,d\Omega,$$

здесь $d\Omega$ — телесный угол, под которым площадка dS видна из точечного заряда q.

Пусть заряд q находится внутри замкнутой поверхности, тогда

$$\left.\begin{aligned} \Phi_E &= \oint_S d\Phi_E \\ d\Phi_E &= q\,d\Omega \end{aligned}\right\} \quad => \quad \Phi_E = \oint_S q\,d\Omega = q\oint_S d\Omega = q\,4\pi = 4\pi q.$$

Итак, если точечный заряд находится внутри замкнутой поверхности, то формула $\Phi_E = 4\pi Q$ доказана.

Рассмотрим теперь заряд, расположенный снаружи от объема V.



Из рисунка видно, что ближняя и дальняя границы объема относительно заряда видны под одинаковым телесным углом Ω. Тогда потоки через обе части границы одинаковы по модулю и равны $\Phi_E = q\Omega$, так как $d\Phi_E = q\,d\Omega$. Модули потоков равны, но знаки потоков противоположны. В таком случае поток через всю замкнутую поверхность будет равен нулю $\Phi_E = 0$.

В данной конфигурации зарядов внутри объема нет $Q = 0$. Поэтому равенство $\Phi_E = 4\pi Q$ выполнено и в этом случае с учетом равенства $\Phi_E = 0$.

Рассмотрим теперь вторую часть доказательства, когда зарядов много.

На равенство $\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$ подействуем оператором $\oint_S \left(\cdot, d\vec{S}\right)$ и получим

$$\oint_S \left(\vec{E}, d\vec{S}\right) = \oint_S \left(\sum_i \vec{E}_i, d\vec{S}\right). \qquad => \qquad \oint_S \left(\vec{E}, d\vec{S}\right) = \sum_i \oint_S \left(\vec{E}_i, d\vec{S}\right) =>$$

$\Phi_E = \sum_i \Phi_{E_i}$, =>

$\Phi_E = \sum_i \Phi_{E_i} = \sum_i 4\pi Q_i = 4\pi \sum_i Q_i = 4\pi Q$ =>

$\Phi_E = 4\pi Q$,

что и требовалось доказать.

Факультативно. Линии поле $\vec{E}$ не рвутся.

Если в объеме нет зарядов $Q = 0$, то $\Phi_E = 4\pi Q = 0$. Поток равен нулю — это значит, сколько линий поля втекает в объем, столько и вытекает.

Следовательно, линии поля $\vec{E}$ не начинаются и не заканчиваются в пустом объеме без зарядов. В этом смысле линии поля $\vec{E}$ не рвутся. Это справедливо и для переменных электрических полей.



Линии поля $\vec{E}$ вытекают из положительных зарядов и втекают в отрицательные заряды. В этом смысле заряды буквально являются источниками поля.

Экзамен. Теорема Ирншоу.

Невозможно статическое распределение зарядов, в котором хотя бы один заряд находится в устойчивом равновесии.

Отметим, что неустойчивое равновесие возможно, например:



Доказательство.

Проведем доказательство методом "от противного".

Предположим, что для одного из зарядов есть устойчивое равновесие и получим противоречие.

Будем считать, что все заряды дискретные — точечные.

Пусть в устойчивом равновесии находится заряд q, например положительный.

Для устойчивого равновесия поле сил при смещении в любую сторону пытается вернуть заряд в точку равновесия. Тогда, если сдвигать заряд q, то поле сил $\vec{F}$ со стороны остальных зарядов на этот заряд q имеет следующий вид:



Аналогично выглядит и поле $\vec{E}$ остальных зарядов, кроме рассматриваемого заряда q, так как $\vec{E} = \dfrac{\vec{F}}{q}$.

Рассмотрим маленькую сферу вокруг заряда q:



Из рисунка видно, что поток поля $\vec{E}$ остальных зарядов через эту сферу отрицательный $\Phi_E < 0$. Это с одной стороны, а с другой стороны поток равен нулю $\Phi_E = 0$. И действительно, внутри малой сферы вокруг заряда q нет других зарядов, и для этих других зарядов $Q = 0$. Следовательно, для поля $\vec{E}$ остальных зарядов, кроме заряда q, получим $\Phi_E = 4\pi Q = 0$.

Итак $\begin{cases} \Phi_E < 0 \\ \Phi_E = 0 \end{cases}$. Полученное противоречие доказывает теорему.

<u>Экзамен. Потенциальность кулоновских сил.</u>

Поле сил потенциально (силы консервативны), если работа по перемещению в этом поле пробного заряда не зависит от формы траектории, а зависит только от начальной и конечной точки.

Докажем сначала потенциальность сил со стороны поля одного точечного заряда q. Для этого найдем работу электростатических сил $A'_{I \to II}$ при перемещении пробного заряда q' из точки I в точку II:



Пусть начало координат совпадает с зарядом q. Найдем работу dA' на малом участке пути $d\vec{l}$:

$$dA' = \left(\vec{F}', d\vec{l}\right) = \left(q'\vec{E}, d\vec{l}\right) = q'E\,dl_E = q'E\,dl_r \approx q'E\,dr = q'\frac{q}{r^2}dr\,.$$



Из рисунка видно, что $dl_r \approx dr$.

Работа на конечном участке

$$A'_{I\to II} = \int_I^{II} dA' = \int_{\vec{r}_I}^{\vec{r}_{II}} q'\frac{q}{r^2}dr = q'q\int_{\vec{r}_I}^{\vec{r}_{II}} \frac{dr}{r^2} = q'q\left(-\frac{1}{r}\right)\Bigg|_{r_I}^{r_{II}} = q'q\left(\frac{1}{r_I} - \frac{1}{r_{II}}\right) \quad =>$$

$A'_{I\to II} = q'q\left(\frac{1}{r_I} - \frac{1}{r_{II}}\right)$ — работа электростатических сил по перемещению пробного заряда q' в поле заряда q из точки $\vec{r}_I$ в точку $\vec{r}_{II}$, если начало координат совпадает с зарядом q.

Это выражение не зависит от формы траектории, следовательно, поле $\vec{E}$ точечного заряда потенциально.

Докажем теперь потенциальность сил произвольного распределения точечных зарядов.

Из принципа суперпозиции

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i \quad \Bigg| \quad \int_{\vec{r}_I}^{\vec{r}_{II}} \left(q'\cdot, d\vec{l}\right) \quad =>$$

$$\int_{\vec{r}_I}^{\vec{r}_{II}} \left(q'\left(\vec{E}\right), d\vec{l}\right) = \int_{\vec{r}_I}^{\vec{r}_{II}} \left(q'\left(\sum_i \vec{E}_i\right), d\vec{l}\right) =>$$

$$\int_{\vec{r}_I}^{\vec{r}_{II}} \left(q'\vec{E}, d\vec{l}\right) = \sum_i \int_{\vec{r}_I}^{\vec{r}_{II}} \left(q'\vec{E}_i, d\vec{l}\right) \quad =>$$

$$A'_{I\to II} = \sum_i A'_{i,I\to II} = \sum_i q'q_i\left(\frac{1}{r_{iI}} - \frac{1}{r_{iII}}\right)$$

$$A'_{I\to II} = q'\sum_i q_i\left(\frac{1}{r_{iI}} - \frac{1}{r_{iII}}\right) = q'\sum_i q_i\left(\frac{1}{\left|\vec{r}_I - \vec{r}_i\right|} - \frac{1}{\left|\vec{r}_{II} - \vec{r}_i\right|}\right)$$

— работа электростатических сил по перемещению пробного заряда q' из точки I в точку II. Здесь $\vec{r}_{iI} = \vec{r}_I - \vec{r}_i$ — вектор из i-го заряда в точку I, $\vec{r}_{iII} = \vec{r}_{II} - \vec{r}_i$ — вектор из i-го заряда в точку II.

Экзамен. Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле.

Энергия — это способность совершить работу, поэтому:

$W'_I \equiv A'_{I\to\infty}$.

Электростатическая энергия заряда q' в точке I по определению равна работе электростатических сил по перемещению этого заряда из точки I на бесконечность.

$$W'_I \equiv A'_{I\to\infty} = A'_{I\to II}\Big|_{II\to\infty} = q'\sum_i q_i\left(\frac{1}{r_{iI}} - \frac{1}{r_{iII}}\right)\Bigg|_{r_{iII}\to\infty} = q'\sum_i q_i\frac{1}{r_{iI}} = q'\sum_i q_i\frac{1}{\left|\vec{r}_I - \vec{r}_i\right|}$$

=> $W'(\vec{r}) = q'\sum_i q_i\frac{1}{\left|\vec{r} - \vec{r}_i\right|}$ - энергия заряда q' в точке с радиус-вектором $\vec{r}$ в поле остальных зарядов q_i.

Экзамен. Потенциал электростатического поля.

Потенциал — потенциальная энергия единичного заряда.

$$\varphi \equiv \frac{W'}{q'}$$

Экзамен. Потенциал произвольного распределения зарядов.

Для системы точечных зарядов q_i получим следующее выражение для потенциала φ в точке с радиус-вектором $\vec{r}$:

$$\varphi(\vec{r}) \equiv \frac{W'(\vec{r})}{q'} = \sum_i \frac{q_i}{\left|\vec{r} - \vec{r}_i\right|}$$

Тогда для произвольного распределения зарядов получим:

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_i \frac{q_i}{\left|\vec{r} - \vec{r}_i\right|} + \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}\,')\,dV'}{\left|\vec{r} - \vec{r}\,'\right|} + \int_{S'} \frac{\sigma(\vec{r}\,')\,dS'}{\left|\vec{r} - \vec{r}\,'\right|} + \int_{l'} \frac{\tau(\vec{r}\,')\cdot dl'}{\left|\vec{r} - \vec{r}\,'\right|}$$

$\varphi = \frac{q}{r}$ — потенциал поля точечного заряда.

В системе СИ $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q}{r}$.